
ฐานเรียนรู้คนรักษ์สัตว์



การเพาะพันธุ์กบ

การดูเพศของกบ

กบเพศผู้ จะตัวเล็กกว่าเพศเมีย มีกล่องเสียงเป็นช่องกลมขนาดเล็กที่ใต้คาง

กบเพศเมีย ลำตัวจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ ด้านข้างลำตัวจะสาก ท้องอูม




การคัดเลือกพ่อ-แม่ พันธุ์กบ

กบอายุผสมออกไข่ 12 - 16 เดือนขึ้นไป

ตัวเมีย : ข้างลำตัวจะมีปุ่มสากๆ มือ

ตัวผู้ : ดูที่กล่องเสียงใต้คางและเมื่อจับแล้วเอามือรองรับกบตัวผู้จะกอดมือเรา







1 วัน กบจะฟักออกเป็นตัวลูกอ๊อด

อนุบาลลูกอ๊อดโดยช่วง 2 วันแรก ไม่ต้องให้อาหาร เพราะลูกอ๊อดยังใช้ไข่แดงที่ติดมาเลี้ยงตัวเอง หลังจากนั้นให้ไข่แดงต้มสุกบดละเอียดเป็นอาหาร

พื้นที่

บ่อซีเมนต์ ขนาด 3x3 เมตร หรืออ่างสีดำ เตรียมน้ำที่ ระดับ 10 - 15 ซม. ใส่ผักบุ้งหรือสาหร่ายที่ล้างสะอาด ลงไปพอประมาณ





นำพ่อ-แม่ พันธุ์กบ ลงปล่อยในบ่ออัตราส่วน ตัวเมีย 5 ตัว ตัวผู้ 6 ตัว (หรือ ในอ่างสีดำ ตัวเมีย 1 ตัว ตัวผู้ 2 ตัว) ปิดคลุมบ่อ ปล่อยให้กบจับคู่กันอย่างสงบ

เช้าวันต่อมาให้สังเกตุดูว่ากบวางไข่หรือไม่ (ถ้ายังไม่ว่างไข่ก็ปล่อยไว้ในบ่อต่อไป) หากพบว่าว่างไข่แล้ว ให้ตักพ่อแม่พันธุ์ออกจากบ่อ เพื่อป้องกันไม่ให้กบกินไข่ตัวเอง



ฐานเรียนรู้คนรักษ์สัตว์

วิธีการให้อาหาร

ลูกอ็อด



ลูกอ็อด อายุ 3-6 วัน ให้ไข่แดง ต้มสุก นำไข่แดงที่ต้มสุกแล้วใส่กระชอนตาละเอียด ขยี้หลาย ๆ ครั้ง ให้ไข่แดงเป็นฝอยเล็ก ๆ

ลูกกบ



ลูกกบ เมื่อฟักออกจากไข่ 1-2 อาทิตย์ จะมีขาหลัง 2 ขา โผล่ออกมา จากส่วนท้ายของลำตัว เมื่อขาหลังเจริญเต็มที่จะมีขาหน้าโผล่มา 2 ข้าง หางเริ่มหด ปากเริ่มสมบูรณ์ขึ้น กินอาหารได้เหมือนกบโต จะเป็นอาหารที่เคลื่อนไหวได้ หรือเครื่องในสับ โดยนำมาผสมกับอาหารเม็ดสำหรับกบเล็ก (ให้จนลูกกบอายุ 1-1.5 เดือน) ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น ในปริมาณที่กบกินอิ่ม สังเกตุโดยกบกินหมดในเวลา 20 นาที





การจำหน่าย

ลูกกบอายุ 1 เดือน หรือขนาดเท่านิ้วก้อยก็สามารถขายได้ เพื่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงต่อ หรือเป็นเหยื่อตกปลา

กระชังบก

ขนาด 2 x 3 เมตร เลี้ยงกบได้ 1000 ตัว
ขนาด 2 x 4 เมตร เลี้ยงกบได้ 1500 ตัว

การดูแลสุขภาพระหว่างการเลี้ยง

มีความสำคัญมาก เพื่อกบที่เลี้ยงเจริญเติบโตดีไม่ป่วยเป็นโรค

1. เปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อย ๆ หรือทุกวัน เก็บเศษอาหารทุกวัน เพราะกบชอบน้ำนิ่งสะอาด ควรถ่ายน้ำตอนเช้า ก่อนให้อาหาร จากนั้น 30 นาที จึงให้อาหาร เพราะถ้ากบตกใจ จุก เกร็ง อาหารไม่ย่อย กบจะตายได้
2. คัดขนาดกบทุก 2 สัปดาห์ ขนาดเท่ากันเลี้ยงบ่อเดียวกัน เพื่อให้กบเจริญเติบโตดีขึ้น ป้องกันกบรังแกกัน กินกันเอง
3. เมื่อกบตัวใดผิดปกติ ให้แยกกบเลี้ยงต่างหาก ป้องกันการป่วยติดต่อกันทั้งบ่อ
4. ให้มีแสงแดดส่องถึงพื้น





จัดทำโดย : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ที่มา : กรมประมง